



## Síntomas de Hiperactividad e impulsividad.

- ⇒ Mueve continuamente las manos o los pies, o se retuerce.
- ⇒ Abandona a menudo su asiento en la clase o en otros lugares.
- ⇒ A menudo corre o trepa en exceso en sitios donde estas actividades resultan inapropiadas.
- ⇒ Tiene dificultad para jugar tranquilamente.
- ⇒ Siempre está haciendo algo o actúa como si tuviera un motor.
- ⇒ Habla en exceso.
- ⇒ Responde antes de que se completen las preguntas.
- ⇒ Tiene dificultad aguardar su turno.
- ⇒ Interrumpe a los demás o se entromete en sus actividades.

## Conceptos clave:

- ⇒ El TDAH implica la falta de atención, hiperactividad/ impulsividad, o una combinación; que normalmente aparece antes de los 12 años, incluso en niños de edad preescolar.
- ⇒ La causa es desconocida, pero hay numerosos factores de riesgo sospechosos.
- ⇒ Diagnosticar mediante criterios clínicos, y estar alerta para otros trastornos que pueden manifestarse inicialmente de manera similar (trastorno del espectro autista, ciertos trastornos del aprendizaje o del comportamiento, ansiedad o depresión).
- ⇒ Las manifestaciones tienden a disminuir con la edad, pero los adolescentes y adultos pueden tener dificultades residuales.
- ⇒ Tratar con drogas estimulantes y terapia cognitivo-conductual; la terapia conductual sola puede ser apropiada para los niños en edad preescolar.

### Referencias:

- <https://healthychildren.org>
- <https://www.mayoclinic.org>

## UDEEI 288 TRABAJO SOCIAL

LIC. T.S. NATALI SARMIENTO ROLDAN

**MAESTRA ESPECIALISTA**  
VICTORIA CAROLINA DURAN



# TRANSTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN



